

Liebes Apothekenteam!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Kundinnen und Kunden von **1. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025** von einem Fixpreis **ab 9,99 Euro** beim Kauf folgender Produkte profitieren können:

- **easyangin® Zitronengeschmack Lutschtabletten, 24 Stück** (PZN 4222565)
- **easyangin® Mentholgeschmack Lutschtabletten, 24 Stück** (PZN 3913706)
- **easyangin® Honiggeschmack Lutschtabletten, 24 Stück** (PZN 4989232)
- **easyangin® Spray, 30 ml** (PZN 4222714)
- **easyangin® junior Lutschtabletten, 30 Stück** (PZN 4150400)
- **easyangin® Honiggeschmack Lutschtabletten, 36 Stück** (PZN 6056042)
- **easyangin® Mentholgeschmack Lutschtabletten, 36 Stück** (PZN 6056059)
- **easyangin® Zitronengeschmack Lutschtabletten, 36 Stück** (PZN 6056065)

Sie verfügen über eine aktive Schnittstelle Ihres Kassasystems zum APOVERLAG Couponing? Wenn ja, können Sie bei jedem Einkauf von einem **der oben genannten Produkte den untenstehenden QR-Code** (siehe abtrennbare Coupons unten) scannen. Die Abrechnung erfolgt nach Monatsende automatisch durch den APOVERLAG.

Ihr Kassasystem ist nicht mit dem APOVERLAG Couponing verknüpft? Dann können Sie an der **laufenden Aktion leider nicht teilnehmen**. Wenn Sie an der Nutzung einer digitalen Couponing-Schnittstelle interessiert sind, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Apothekensoftwarebetreuer.

Die gewährten Rabatte werden Ihnen automatisch vom APOVERLAG nach Prüfung rücküberwiesen. Die Rückerstattungen geschehen einmal im Monat. Eine Aufstellung erhalten Sie per E-Mail bzw. ist diese auch jederzeit in Ihrem Kundenkonto einsehbar.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter:innen des APOVERLAG gerne unter **+43 (0)1 402 35 88-535** zur Verfügung.

easyangin® bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

Trennen Sie die Allonge inkl. QR-Code ab und überraschen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit einem SOFORT-Rabatt!

easyangin® bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

- easyangin® Zitronengeschmack Lutschtabletten, 24 Stück**
- easyangin® Mentholgeschmack Lutschtabletten, 24 Stück**
- easyangin® Spray, 30 ml**
- easyangin® junior Lutschtabletten, 30 Stück***
- easyangin® Honiggeschmack Lutschtabletten, 36 Stück**
- easyangin® Mentholgeschmack Lutschtabletten, 36 Stück**
- easyangin® Zitronengeschmack Lutschtabletten, 36 Stück**

** Arzneimittel; Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
*** Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.



\$IKATG250505102500001

In Kooperation mit
APOVERLAG

* Aktion gültig von 1.10.2025 bis 31.12.2025. Gutschein nur bei Kauf der angegebenen Produkte innerhalb des angegebenen Zeitraums gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Coupons oder Treuepässen. Alle Angaben zu Preisen, Produkttexten, Produktbildern sind ohne Gewähr, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PZN 4222565, PZN 3913706, PZN 4989232
PZN 4222714, PZN 4150400, PZN 6056042
PZN 6056059, PZN 6056065
Werbenummer EA017ANG_0325

FACHKURZINFORMATION:

FKI easyangin Honiggeschmack Lutschtabletten: **Bezeichnung des Arzneimittels:** easyangin Honiggeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entspricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 1,21 g Sorbitol, Sulfite. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol, Magnesiumstearat, wasserfreie Zitronensäure, Stevia, Honigaroma. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomatischen lokalen Behandlung des Rachenraumes als Antiseptikum und lokal wirkendes Schmerzmittel bei Halsschmerzen und Erkrankungen des Rachenraumes, Entzündungen wie Pharyngitis, Gingivitis, Stomatitis und Aphthen. Bei einer mit Fieber einhergehenden bakteriellen Infektion ist eine zusätzliche Behandlung erforderlich. easyangin Honiggeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum.** Kinder unter 6 Jahren. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hals- und Rachen therapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

FKI easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten: **Bezeichnung des Arzneimittels:** easyangin Mentholgeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entpricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1,21 g Sorbitol (E 420)/Lutschtablette. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol (E 420), Magnesiumstearat, Zitronensäure (wasserfrei), Menthol. **Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden, kurzzeitigen lokalen Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches), easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile.** Bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum. Kinder unter 6 Jahren. easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten dürfen wegen des Gehaltes an Menthol nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von easyangin Mentholgeschmack Lutschtabletten kann zur Bronchokonstriktion führen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hals- und Rachen therapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

FKI easyangin Zitronengeschmack Lutschtabletten: **Bezeichnung des Arzneimittels:** easyangin Zitronengeschmack 5 mg/1 mg Lutschtabletten **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** 1 Lutschtablette enthält 5 mg Chlorhexidin Dihydrochlorid (entpricht 4,4 mg Chlorhexidin) und 1 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,8 mg Lidocain). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 5 mg Aspartam (E 951)/Lutschtablette und 1,21 g Sorbitol (E 420)/Lutschtablette. Liste der sonstigen Bestandteile: Sorbitol, Magnesiumstearat, Aspartam, Acesulfam Kalium, Zitronenaroma Sorbitol (E 420), Magnesiumstearat, Aspartam (E 951), Acesulfam Kalium, Zitronenaroma. **Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden, kurzzeitigen lokalen Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches). easyangin Zitronengeschmack Lutschtabletten werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile.** Bei größeren, frischen Wunden im Mund- und Rachenraum. Kinder unter 6 Jahren. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hals- und Rachen therapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

FKI EASYANGIN SPRAY: **Bezeichnung des Arzneimittels:** easyangin Spray zur Anwendung in der Mundhöhle **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** 1 ml Lösung enthält 2 mg Chlorhexidingluconat und 0,5 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,4 mg Lidocain). 1 Sprühstoß enthält 0,17 mg Chlorhexidingluconat und 0,04 mg Lidocain Hydrochlorid Monohydrat (entspricht 0,032 mg Lidocain). Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 1 ml Lösung enthält 350 mg Ethanol, 200 mg Glycerol. Liste der sonstigen Bestandteile: Ethanol, Glycerol, Menthol, Cineol, Saccharin-Natrium, Zitronensäure-Monohydrat, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden, kurzzeitigen lokalen Behandlung bei leichten bis mittelschweren Entzündungen des Rachenraumes und der Mundhöhle (Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie des Zahnfleisches (Gingivitis, Stomatitis und Aphthen)). easyangin Spray zur Anwendung in der Mundhöhle wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. **Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der sonstigen Bestandteile;** größere, frische Wunden im Mund- und Rachenraum; Kinder unter 6 Jahren; easyangin Spray zur Anwendung in der Mundhöhle darf wegen des Gehaltes an Menthol und Cineol nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von easyangin Spray zur Anwendung in der Mundhöhle kann zu einer Bronchokonstriktion führen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hals- und Rachen therapeutika, Antiseptika, ATC-Code: R02AA05, Lokalanästhetika, ATC-Code: R02AD02 **Inhaber der Zulassung:** Easypharm OTC GmbH, Mariahilfer Straße 116/6, AT-1070 Wien. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Stand der Fachkurzinformation:** August 2024. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**